

hemavit FORTE MAX 1 liter, 5 liter, 20 liter

MULTIVITAMIN-, ÉS NYOMELEM-KIEGÉSZÍTŐ, AMINOSAVVAL

Összetétel (literenként)

Hatóanyag	Mennyiség	Hatóanyag	Mennyiség	
A vitamin	2 500 000 I.U.	Aminosavak		
D3 vitamin	500 000 I.U.		Lizin	5 000 mg
E vitamin (<i>dl α tokoferol</i>)	5 000 mg		Glutaminsav	3 500 mg
B1 vitamin	1 000 mg		Glicin	3 000 mg
B2 vitamin	2 000 mg		Treonin	3 000 mg
B6 vitamin	2 000 mg		Metionin	1 500 mg
B7 vitamin (Biotin)	2 000 mg		Arginin	1 000 mg
B12 vitamin	10 mg		Fenil-alanin	900 mg
C vitamin	3 000 mg		Prolin	900 mg
K3 vitamin	1 000 mg		Szerin	900 mg
			Valin	800 mg
Nátrium - propionát	3 000 mg		Alanin	750 mg
Nátrium-klorid	5 000 mg		Tirozin	650 mg
Magnézium-szulfát	1 500 mg		Triptofán	600 mg
Kálium	1 000 mg	Hisztidin	525 mg	
Mangán-szulfát	600 mg	Izoleucin	500 mg	
Cink-szulfát	600 mg	Cisztin	200 mg	
Vas-szulfát	20 mg			

Célállat Baromfi, sertés, szarvasmarha

Hatása Az A-, és D- vitaminok, valamint a Biotin elengedhetetlenül szükségesek a vázrendszer hámszöveteinek fejlődéséhez. A B-vitaminok biztosítják az enzimek számára mindazon tényezőket, amelyek a szénhidrátok, fehérjék szintézisét és a zsír lebontását irányítják. A metionin és a kolin elősegíti a máj méregtelenítő tevékenységét. A nyomelemek megléte a legfontosabb katalizátor a hemoglobin szintézise számára.

Előnyei A hemavit MULTIX *jelentős mennyiségben* tartalmaz E, B5, B6 és B12 vitamint, növelve a szervezet kórokozókkal szembeni ellenálló képességét, fertőzések esetén az ellenanyag-termelést, a vörösvértestek képződését, regenerálódását, javítja az emésztést, a zsírok, aminosavak felszívódását, a táplálék komponensek hasznosulását, segít megakadályozni a bőrbetegségeket, *a nyomelemeket pedig szerves kötésben tartalmazza*, mely elősegíti azok felszívódását, hasznosulását.

Javallat Betegségek kialakulásának kockázatának csökkentésére, megelőzésre és gyógykezelések kiegészítésére. Stresszhelyzetekre: pl. tolltépés, kannibalizmus, állomány-átcsoportosítás, szállítás. Antibakteriális szerek, és szintetikus kokcidiosztatikumok után, féregtelenítő terápiát követően. Kérődzőknél ketózis megelőzésére, kezelésére, a gyógykezeléséhez hozzájárulva. Továbbá: takarmány gombatoxin, Gumborói-betegség, pneumovírus, ornitobakter, E-coli okozta CRD megjelenésekor. Hiányos étrend kiegészítésére, vitaminhiány megelőzésére, húshozam és tojástermelés fokozására.

Adagolás

Állatfaj	Dózis
Baromfi, fácán	1 ml/ 4 l itatóvíz; 4 - 5 napig, vagy a tünetek észleléséig
Sertés	30 ml/állat/nap; 5 - 10 napon át
Szarvasmarha	20 - 30 ml/állat/nap; 5 napon át, havonta egyszer
Borjú	5 - 10 ml/nap/állat 5 napon át havonta
Üsző	30 ml/nap 5 napon át pároztatás előtt
Tejelő tehén	30 - 50 ml/nap 5 napon át havonta egyszer vagy naponta 5 ml

Mellékhatás nincs

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő 0 nap

Tárolás Hűvös, fénytől védett, száraz, gyermekektől elzárt helyen. (0 - 30 °C)

Minőségmegőrzési idő 18 hónap

Származás EU

Forgalmazza HeMA Magyarország Kft. www.hema.hu; hema@hema.hu;
T: (+36 30) 678 2583; α HU 20 2 0029