

## hemavit Hepar pulvis 25 kg

EMÉSZTÉST SEGÍTŐ, MÁJVÉDŐ HATÁSÚ KÉSZÍTMÉNY

### Összetétel (kilogrammonként)

Hatóanyag	Mennyiség
Szorbitol	300 000 mg
Metionin (acetyl)	100 000 mg
Lizin	20 000 mg
Betain	35 000 mg
Kolin-klorid	50 000 mg
Glénan-szigeteki algakivonat	
Liszt gyártási melléktermék	
Szepiolit (magnézium triszilikát)	
Növényi kivonat (boldo, articsóka)	

**Célállat** Sertés

**Hatása** A szorbitol serkenti az emésztő és hasnyálmirigy enzimeit, az epe elválasztását, különösképpen a zsírok emulgeálását, valamint zsíroldékony A-, D-, E-, K-vitaminok felszívódását. A megnövelt mennyiségű metionin és kolin (amelyek májvédő, valamint lipotróp hatásúak) kitűnően egészítik ki a legtöbbször metionin-, és kolinszegény takarmányokat. A betain biztosítja a zsírok (lipid) zavartalan metabolizmus folyamatait. A magnézium és nátrium elősegítik a bél motorikus funkcióinak zavartalan működését.

**Előnyei** Máj-, és veseműködést szabályzó. Javítja a tenyészállatok szaporodásbiológiai mutatóit, tojótyúkknál a tojáshozamot és keltethetőséget, valamint a spermioenezist.

**Javallat** Segít megelőzni a hirtelen elhullást okozó zsírmáj-szindróma kialakulását. Használata különösen erőteljes növekedés, illetve fialás, ellés és szoptatás idején ajánlott.

**Alkalmazás** takarmányba keverve

**Adagolás** havonta 3-5 napon keresztül

Állatfaj	Mennyiség
Koca	10 kg/tonna takarmány vagy 70 g/koca/nap fialás előtt és után 5-7 napig
Sertés	20 g/állat/nap 3 - 5 napon át, vagy 3 kg/tonna takarmány

**Mellékhatás** nincs  
**Élelmezés-egészségügyi várakozási idő** 0 nap

**Tárolás** Hűvös, fénytől védett, száraz, gyermekektől elzárt helyen. (0 - 30 °C)  
**Minőségmegőrzési idő** 18 hónap  
**Származás** EU  
**Forgalmazza** HeMA Magyarország Kft. [www.hema.hu](http://www.hema.hu); [hema@hema.hu](mailto:hema@hema.hu);  
T: 06 1 365 1196, F: 06 1 365 1197; α HU 20 2 0029